

Решение неравенств из ЕГЭ (С3) методом равносильных преобразований

**Выполнила:
учитель математики
высшей категории
МБОУ СОШ № 32
Т.В. Логинова**

г. Энгельс, 2012 год

Отчет ФИПИ по выполнению неравенств: иррациональных, показательных, логарифмических (С3)

2011 г.

	С3
Не приступали (в %)	56,6
Приступили, но получили 0 балл	23,9
1 балл (в %)	12,8
2 балла (в %)	3
3 балла (в %)	3,7
Положительный результат (в %)	19,5

2012 г.

	С3
Не приступали (в %)	62,19
Приступили, но получили 0 балл	26,26
1 балл (в %)	7,88
2 балла (в %)	1,27
3 балла (в %)	2,39
Положительный результат (в %)	11,54

Основные ошибки при решении неравенств (СЗ)

- ❖ Ошибки в применении свойств логарифма.
- ❖ Плохое знание свойств логарифмической функции, показательной.
- ❖ Неумение применять замену переменной.
- ❖ Неумение применять метод интервалов при решении неравенств повышенного и высокого уровней сложности.
- ❖ Неумение применять метод равносильных преобразований, при решении неравенств повышенного и высокого уровней сложности.
- ❖ Некорректное использование систем и совокупностей.
- ❖ Незнание рациональных методов решения неравенств повышенного и высокого уровня сложности.

Рациональный метод решения неравенств – метод равносильных преобразований по знаку

- ❖ Этот метод не относится к стандартным школьным, но позволяет многие неравенства решать быстро и красиво.
- ❖ С помощью условий равносильности будем сводить решение многих неравенств, содержащих показательные, логарифмические, иррациональные выражения и выражения с модулем, к решению рациональных неравенств классическим методом интервалов для рациональных функций.

Неравенства, содержащие иррациональные выражения

Неравенство вида $\sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)}$

Правило 1: Знак выражения $\sqrt{f(x)}$ совпадает со знаком выражения $f(x)$ в ОДЗ.

Правило 2: Знак разности $\sqrt{f(x)} - \sqrt{g(x)}$ совпадает со знаком разности $f(x) - g(x)$ в ОДЗ.

Пример : $\frac{\sqrt{2x^2-3x-5}}{\sqrt{x-2}} < \sqrt{x+1}$

Решение:

$$1. \text{ОДЗ: } \begin{cases} x^2 - 3x - 5 \geq 0 \\ x+1 \geq 0 \\ x-2 > 0 \end{cases}$$

2. Применяем метод равносильных преобразований по знаку

$$\frac{\sqrt{2x^2-3x-5}-\sqrt{x^2-x-2}}{\sqrt{x-2}} < 0; \quad \frac{x^2-2x-3}{x-2} < 0$$

3. Учитываем ОДЗ. $\frac{(x+1)(x-3)}{x-2} < 0$

Ответ: $[-\frac{5}{2}; 3)$.

Неравенства, содержащие выражения с модулем

Неравенство вида $|f(x)| < |g(x)|$

Правило 1: Знак разности модулей $|f(x)| - |g(x)|$ совпадает со знаком произведения $(f(x)-g(x))(f(x)+g(x))$.

Правило 2: Знак выражения $|f(x)| - \sqrt{g(x)}$ совпадает со знаком выражения $(f(x))^2 - g(x)$ в ОДЗ.

Пример:

$$(\sqrt{3x+5} - \sqrt{x+3})(|x-4| - x^2 - 2) < 0$$

Решение:

$$1. \text{ ОДЗ: } \begin{cases} 3x+5 \geq 0 \\ x+3 \geq 0 \end{cases}$$

2. Выполняем равносильные преобразования по знаку по правилам:

$$(3x+5-x-3)((x-4)^2 - (x^2+2)^2) < 0$$

Решаем методом интервалов, учитывая ОДЗ, получаем ответ.

Ответ: $-2 < x < -1; x > 1$.

Неравенства, содержащие показательные и логарифмические выражения

Выведем такие условия равносильности, которые часто за один шаг сведут решение самых распространенных неравенств, содержащих показательные и логарифмические выражения, к решению рациональных неравенств.

Показательные неравенства

Рассмотрим неравенство $a^{f(x)} > a^{g(x)}$.

- Если $a > 1$, то $f(x) > g(x)$ и $(a-1)(f(x) - g(x)) > 0$
- Если $0 < a < 1$, $f(x) < g(x)$ и снова $(a-1)(f(x) - g(x)) > 0$.

Таким образом, мы вывели условие равносильности.

Правило 1: Знак разности $a^{f(x)} - a^{g(x)}$ совпадает со знаком произведения $(a-1)(f(x) - g(x))$.

При конкретном a неравенство $a^{f(x)} > a^{g(x)}$, конечно, может быть решено стандартным способом, и объем выкладок тот же, но здесь есть некоторое преимущество – не надо задумываться над тем, какое a : больше оно или меньше 1.

Правило 2: Знак разности $a(x)^{f(x)} - a(x)^{g(x)}$ совпадает со знаком произведения $(a(x) - 1)(f(x) - g(x))$ в ОДЗ

$(a(x) > 0, a(x) \text{ может быть равно } 1, \text{ если } a^{f(x)} \geq a^{g(x)})$.

Показательные неравенства

Пример 1:

$$\frac{(3^x - 1)(2^{x^2} - 16)}{x^2 + x - 2} \geq 0$$

Решение:

1. ОДЗ: $x^2 + x - 2 \neq 0$

2. Применяем равносильное преобразование по знаку по правилу 1:

$$\frac{(x-0)(x^2-4)}{(x+2)(x-1)} \geq 0$$

Решаем методом интервалов, учитываем ОДЗ, получаем ответ.

Ответ: $0 < x < 1; x \geq 2$.

Неравенства, содержащие показательные выражения

Пример 2:

$$1 \leq 3^{\left| \frac{4x-3}{2x-1} \right|} \leq 27$$

Решение:

$$3^0 \leq 3^{\left| \frac{4x-3}{2x-1} \right|} \leq 3^3$$

Используя равносильную замену по знаку для показательной функции, получаем:

$(3-1)\left(\left| \frac{4x-3}{2x-1} \right| - 3\right) \leq 0$, используя равносильную замену для модуля, получаем:

$$\left(\frac{4x-3}{2x-1}\right)^2 - 3^2 \leq 0$$

$$\frac{x(5x-3)}{(2x-1)^2} \geq 0$$

$\frac{x(x-\frac{3}{5})}{(x-\frac{1}{2})^2} \geq 0$, решаем методом интервалов получаем ответ.

Ответ: $x \leq 0$; $x \geq \frac{3}{5}$; $x = \frac{3}{4}$.

Неравенства, содержащие логарифмические выражения

Рассмотрим неравенство $\log_a f(x) > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$, $f(x) > 0$.

- Если $a > 1$, то $\log_a f(x) > 0$ тогда и только тогда, когда $f(x) > 1$, то есть $(a-1)(f(x)-1) > 0$.
- Если $0 < a < 1$, то $\log_a f(x) > 0$ тогда и только тогда, когда $f(x) < 1$, то есть опять $(a-1)(f(x)-1) > 0$.

Правило 1: Знак $\log_a f(x)$ совпадает со знаком произведения $(a-1)(f(x)-1)$ в ОДЗ.

Правило 2: Знак функции $\log_{a(x)} f(x)$ совпадает со знаком произведения $(a(x)-1)(f(x)-1)$ в ОДЗ.

Неравенства, содержащие логарифмические выражения

Рассмотрим неравенства $\log_a f(x) > \log_a g(x)$,

$$a > 0, a \neq 1, \begin{cases} f(x) > 0, \\ g(x) > 0 \end{cases}$$

- Если $a > 1$, то $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ тогда и только тогда, когда $f(x) > g(x)$, то есть $(a-1)(f(x) - g(x)) > 0$
- Если $0 < a < 1$, то $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ тогда и только тогда, когда $f(x) < g(x)$ то есть опять $(a-1)(f(x) - g(x)) > 0$.

Правило 3: Знак разности $\log_a f(x) - \log_a g(x)$ совпадает со знаком произведения $(a - 1)(f(x) - g(x))$ в ОДЗ.

Правило 4: Знак разности $\log_{a(x)} f(x) - \log_{a(x)} g(x)$ совпадает со знаком произведения $(a(x) - 1)(f(x) - g(x))$ в ОДЗ.

Неравенства, содержащие логарифмические выражения

Пример 1:

$$(\log_{0,2}(3x + 1) + \log_5(x - 1)) \cdot (\log_{0,2}(x + 5))^{-1} \geq 1$$

Решение:

1. ОДЗ:
$$\begin{cases} 3x + 1 > 0 \\ x - 1 > 0 \\ x + 5 > 0 \end{cases}$$

2.

$$\frac{\log_{0,2}\left(\frac{3x+1}{x-1}\right) - \log_{0,2}(x+5)}{\log_{0,2}(x+5)} \geq 0$$

Применяя равносильные преобразования по знаку для логарифмической функции по правилам 3 и 1 получаем:

$$\frac{(0,2 - 1)\left(\frac{3x+1}{x-1} - (x+5)\right)}{(0,2 - 1)(x+5 - 1)} \geq 0$$

Решаем неравенство методом интервалов, учитываем ОДЗ и получаем ответ.

Неравенства, содержащие логарифмические выражения

Пример 2:

$$\log_{(10-x^2)} \left(\frac{16x}{5} - x^2 \right) < 1$$

Решение:

1. ОДЗ:
$$\begin{cases} (10 - x^2) > 0 \\ (10 - x^2) \neq 0 \\ \frac{16x}{5} - x^2 > 0 \end{cases}$$

2. Воспользуемся условием равносильного перехода по знаку для логарифмической функции по правилу 3.

$$(10 - x^2 - 1) \left(\frac{16x}{5} - x^2 - 10 + x^2 \right) < 0$$

$$(x-3)(x+3) \left(x - \frac{25}{8} \right) > 0$$

3. Решаем неравенство методом интервалов, учитываем ОДЗ и получаем ответ.

Ответ: $0 < x < 3, \frac{25}{8} < x < \sqrt{10}$.

Неравенства, содержащие логарифмические выражения

Пример 3:

$$\log_{|x-\frac{7}{4}|}(\log_{\frac{1}{2}} x) \leq 0$$

Решение:

1. ОДЗ:
$$\begin{cases} |x - \frac{7}{4}| \neq 1 \\ |x - \frac{7}{4}| > 0 \\ \left(\log_{\frac{1}{2}} x\right) > 0 \\ x > 0 \end{cases}$$

2. Воспользуемся условием равносильного перехода по знаку для логарифмической функции по правилу 2 и для модуля по правилу 1:

$$\left(|x - \frac{7}{4}| - 1\right) \left(\log_{\frac{1}{2}} x - 1\right) \leq 0$$

$$\left(x - \frac{7}{4} - 1\right) \left(x - \frac{7}{4} + 1\right) \left(\frac{1}{2} - 1\right) \left(x - \frac{1}{2}\right) \leq 0$$

3. Решаем неравенство методом интервалов, учитываем ОДЗ и получаем ответ.

Ответ: $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{4}$.

Список использованной литературы

- ◆ Колесникова С.И. Математика. Решение сложных задач Единого государственного экзамена. – М.: Айрис-пресс, 2005.
- ◆ Власова А.П. Математика: тема «Уравнения и неравенства»: тестовые задания базового, повышенного и высокого уровня сложности.-М.: АСТ Астрель.
- ◆ Математика в школе (научно – теоретический и методический журнал), 6/2008.
- ◆ Математика в школе (научно – теоретический и методический журнал), 9/2011, 6/2011.